PARDUBICKÝ KRAJ

DEZINFEKČNÍ PROGRAM

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Činžovních domů 140
533 54 Rybitví

L D N RYBITVÍ

	oblast použití	přípravek	účinná látka	četnost	koncentrace	expozice	účinnost přípravku	způsob aplikace
RUCE	MECHANICKÉ MYTÍ	běžná tekutá mýdla SOFTASKIN	mycí emulze	pacienti i personál několikrát denně, vždy po použití WC, před manipulací se stravou	konc.	-	-	Navlhčit ruce, nanést mýdlo, 30 s umývat, opláchnout tekoucí vodou, utřít do jednorázového ručníku.
	HYGIENICKÁ DEZINFEKCE	PROMANUM Pure SOFTAMAN ViscoRub MANUSEPT BASIC	alkohol	před a po ošetřovatelským úkonem a po sejmutí rukavic	konc.	20 s	ABTM(V) ABTM(V) A(B)T(V)	3 ml dezinfekčního prostředku nanést na suché ruce, vtírat stanoveným postupem minimálně 20 s.
	OŠETŘENÍ RUKOU	ošetřující krémy TRIXO	kosmetická emulze	několikrát denně dle potřeby a vždy na závěr pracovní směny	Vtírat do pokožky dle potřeby a vždy na závěr pracovní směny.			
	UDRŽOVAT VLHKÉ RUCE OD TEKUTÉHO ALKOHOLOVÉHO DEZINFEKČNÍHO PŘÍPRAVKU PO CELOU DOBU EXPOZICE !!!!							
POKOŽKA	DEZINFEKCE POKOŽKY	SOFTASEPT N bezbarvý / barvený	alkohol	před narušením integrity kůže	konc.	15 s	ABTV	Pokožku důkladně smočit, nechat zaschnout. Dodržovat expozici dle dezinfikované oblasti.
	NA SLIZNICE A RÁNY	BRAUNOL	vodný roztok PVP jodu	dezinfekce sliznic, před cévkováním atd.	konc.	1 min	ABCTV	Sliznici důkladně smočit a nechat zaschnout. BRAUNOL - případné ředění dle indikace a příbalové informace.
		OCTENISEPT	octenidin		konc.	1 min	A(B)V	
	DEKOLONIZACE PACIENTŮ S MRSA	PRONTODERM	polyhexanid + betain	postup viz samostatná příloha DŘ				
	OPLACH RAN	PRONTOSAN	polyhexanid + betain	před převazem rány	konc.	1-10 min	A	obložka, oplach, otěr prosáklým tamponem
NÁSTROJE	DEKONTAMINACE CHIRURGICKÉHO INSTRUMENTÁRIA, NÁSTROJŮ A POMŮCEK atd.	STABIMED Fresh	amin	vždy po použití ponořit do dezinfekčního roztoku	1% 0,5%	5 min 15 min	A(B)TM(V)	Po použití ponořit do pracovního roztoku po stanovenou dobu expozice. Opláchnout pitnou vodou. Následně osušit a sterilizovat.
		STABIMED Ultra	aktivní kyslík		1,5%	15 min	ABCTMV	
MALÉ PLOCHY	DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEVOZOVÁ VOZIDLA LEDNICE, ČAJOVÉ KUCHYŇKY	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	podle podrobného harmonogramu práce	1%	30 min	ABCTMV	Vytřít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout.
		MELSEPT SF	glutaraldehyd		0,5%	30 min	A(B)(V)	
	APLIKAČNÍ POMŮCKA NA DEZINFEKCI MALÝCH PLOCH	WIPES	kbelík s jednorázovými utěrkami napuštěnými dezinfekčním roztokem	Aktuální použitý přípravek, koncentrace, expozice a datum plnění musí být vždy uvedeno na etiketě.				Aplikační kbelík naplnit rolí jednorázových utěrek a zalít 3 l zásobního roztoku, před dalším plněním důkladně vymýt a vydezinfikovat Meliseptolem rapid.
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH	MELISEPTOL RAPID - sprej MELISEPTOL WIPES ULTRA - ubrousky	alkohol	vždy při potřebě rychlé dezinfekce	konc.	7 min 1 min	ABCTMV	Povrch postříkat sprejem a rozetřít nebo otřít ubrouskem a nechat zaschnout.
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH Z CITLIVÝCH MATERIÁLŮ	MELISEPTOL WIPES SENSITIVE ubrousek	KAS + alkohol		konc.	1 min	ABTMV	Povrch otřít a nechat zaschnout.
VELKÉ PLOCHY	VELKÉ PLOCHY	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	podle podrobného harmonogramu práce	1%	30 min	ABCTMV	Vytřít či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout.
		MELSEPT SF	glutaralaldehyd		0,50%	30 min	A(B)(V)	
	DEKONTAMINACE při náhodném potřísnění biologickým materiálem.	MELISEPTOL RAPID roztok	alkohol		konc.	1 min	ABCTMV	Koncentrát nalít na buničinu a tím překrýt biologický materiál. Po uplynutí expozice mechanicky očistit a dezinfikovat běžným dez. prostředkem na plochy.
OSTATNÍ	VÝLEVKY, UMYVADLA, TOALETY, PISOÁRY, SIFONY, atd.	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	podle podrobného harmonogramu práce - 1x týdně	1%	30 min	ABCTMV	Do sifonu nalit cca 0,2 l roztoku a nechat působit co nejdéle.
		MELSEPT SF	glutaralaldehyd		0,5%	30 min	ABCTMV	

Roztoky dezinfekčních přípravků se připravují na každou pracovní směnu ČERSTVÉ.
Frekvence střídání dezinfekčních přípravků 1x za měsíc. (sudý a lichý měsíc)
Pro naředění dezinfekčních roztoků používat studenou vodu. Při práci s koncentráty dezinfekčních přípravků používat osobní ochranné pracovní pomůcky.

LEGENDA ÚČINNOSTI	A- baktericidní B - plně virucidní, (B) - omezeně virucidní T - tuberkulocidní	M - mykobaktericidní C - sporicidní V - fungicidní, (V) - levurocidní (na kvasinky)

Vypracovala:	Kristýna Chaloupková - epidemiologická sestra
Schválila:	Mgr. Mgr. Jana Tomšů - ředitelka
Za dodržování zodpovídá:	sestra oddělení
Platnost od:	1.10.2021